

NOTE

SUR

DEUX ARAIGNÉES NOUVELLES

de la famille des Argiopidæ

PAR

Roger de LESSERT

Avec 6 figures dans le texte.

En rédigeant pour le Catalogue des Araignées de la Suisse¹, qui doit paraître prochainement, la liste des *Argiopidæ*, il nous a été permis de rectifier deux erreurs de détermination que nous signalons ici.

L'une concerne *Cnephalocotes pusillus* cité par MÜLLER et SCHENKEL en 1895², l'autre *Gongylidiellum latebricola* que nous avons mentionné en 1907³. D'après M. le Dr KULCZYNSKI qui a bien voulu les examiner, ces deux formes, qui ne se rapportent ni à l'une, ni à l'autre des espèces précitées, ne peuvent être attribuées à aucune espèce connue.

Nous les décrivons donc ici comme nouvelles et les dédions en hommage respectueux à MM. les Drs DAHL et KULCZYNSKI.

¹ Ce catalogue comprend aussi les Araignées des régions limitrophes de la Suisse, comme c'est le cas ici pour *C. Dahli* et *G. Kulczynskii*.

² Verhandl. naturf. Ges. Basel, vol. 10, p. 738. 1895.

³ Revue suisse de Zoologie, vol. 15, p. 111. 1907.

Famille : **ARGIOPIDÆ**

Genre : **CNEPHALOCOTES** Simon.


Cnephalogotes Dahli nov. spec.

Fig. 1 à 4.

SYN. *C. pusillus*, MÜLLER et SCHENKEL, *Verzeichnis der Spinnen von Basel und Umgegend*, in : Verhandl. naturf. Ges. Basel, vol. 40, p. 738. 1895.

♂ : Céphalothorax brun-rougeâtre, avec les stries céphaliques noirâtres, presque lisse en dessus, chagriné sur les côtés; vue de côté (fig. 1), partie céphalique droite en dessus, à front obliquement incliné en avant; partie thoracique fortement abaissée en arrière et déprimée. Bandeau avancé en saillie obtuse, rugueuse, dépassant en avant les yeux antérieurs (fig. 3). Yeux antérieurs en ligne faiblement procurvée, les médians beaucoup plus petits que les latéraux, séparés par un intervalle inférieur à leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne faiblement procurvée, les médians séparés par un intervalle un peu moindre que leur diamètre. Chélicères brun-rougeâtre. Sternum brun-noirâtre, lisse. Pattes fauve-rougeâtre. Patte-mâchoire (fig. 1) fauve-rougeâtre, rembrunie à l'extrémité; patella convexe en dessus, un peu plus longue que large; tibia à peine plus long que la patella, fortement élargi vers l'extrémité, graduellement élevé en avant; vu en dessus et un peu en avant (fig. 4), le milieu de son bord antérieur présentant 2 courtes apophyses, dirigées obliquement du côté interne, l'interne obtuse, l'externe en petite pointe noire aiguë, vue de côté, dirigée obliquement en bas et en avant. Tarse à bord supérieur fortement convexe, présentant à la base, du côté externe, une dépression limitée du côté interne par une carène oblique, sinueuse. Bulbe (fig. 2) présentant une lanière

chitineuse noire (style), naissant vers le milieu du bord externe, dirigée obliquement en avant et du côté interne, recourbée du côté externe et en bas à l'extrémité du bulbe, terminée en pointe très fine. Extrémité du bulbe membraneuse, présentant une fine pointe noire, dirigée en avant. Abdomen noirâtre, sans scutum. Longueur totale, 1^{mm},1; céphalothorax, 0^{mm},55. ♀ inconnue.



C. dahli nov. spec. ♂.

Fig. 1. Céphalothorax vu de côté, avec patte-mâchoire droite vue du côté interne (patte-mâchoire gauche supprimée). Fig. 2. Bulbe du côté inféro-externe. Fig. 3. Céphalothorax en dessus. Fig. 4. Tibia de la patte-mâchoire droite en dessus.

Habitat : Grand-Duché de Bade : Isteinerklotz (♂ XII) (MÜLLER et SCHENKEL) ¹.

C. dahli voisin de *C. silus* (Cambridge) ², se distingue aisément de cette dernière espèce par la structure de sa patte-mâchoire.

¹ L'exemplaire typique de cette espèce nous a été obligeamment communiqué par M. le Dr Jean Roux, conservateur du Musée de Bâle.

² *C. silus*. CHYZER et KULCZYNSKI, *Araneæ Hungariæ*, vol. 2, p. 119, pl. 4, fig. 41 a, b, 1894. — *C. silus* (Cb.) est synonyme de *C. pusillus*. SIMON, *Les Arachnides de France*, vol. 5, p. 706, 707, fig. 567-570. 1884.


Genre : GONGYLIDIELLUM Simon.

Gongylidiellum kulczynskii nov. spec.

Fig. 5 et 6.

Syn. *G. lutebricola*, de LESSERT. *Notes arachnologiques*. Revue suisse de Zoologie, vol. 15, p. 411. 1907.

♂ : Céphalothorax fauve-rougeâtre, finement chagriné; partie céphalique légèrement convexe. Yeux antérieurs en ligne presque droite (faiblement recurvée), subcommivents, les médians un peu plus petits que les latéraux. Yeux postérieurs en ligne



G. Kulczynskii nov. spec. ♂.

Fig. 5. Patte-mâchoire droite du côté externe. Fig. 6. Patte-mâchoire droite en dessus.

presque droite, les médians séparés par un intervalle égal environ à leur diamètre. Chélicères fauve-rougeâtre, finement chagrinées, inermes en avant. Sternum fauve-noirâtre. Pattes fauve-rougeâtre. Patte-mâchoire fauve-rougeâtre, légèrement rembrunie en avant; patella un peu plus longue que large; tibia un peu plus court, fortement élargi vers l'extrémité, pourvu en avant, du côté interne, d'une apophyse subtriangulaire, comprimée, peu visible et surmonté d'une apophyse cylindrique, assez grêle, sub-aiguë; vue de côté (fig. 5), arquée en haut et en avant; vue en

dessus (fig. 6), arquée en dehors à l'extrémité. Tarse, vu en dessus (fig. 6), subtriangulaire, fortement atténué en arrière, tronqué presque droit en avant, son bord postérieur externe pourvu d'une carène sinueuse. Paracymbium (difficile à observer) à branche postérieure paraissant légèrement bifide à l'extrémité, à branche antérieure un peu dilatée avant l'extrémité, obtuse. Bulbe pourvu à l'extrémité d'un style en lanière chitineuse, enroulé sur lui-même à la base et limitant une région membraneuse, puis détaché; vu de côté (fig. 5) en forme de S terminé en pointe très fine, recourbée en bas du côté interne. Extrémité du style reliée à la partie basale par une membrane, assez grêle, blanchâtre et translucide, presque invisible sous l'alcool. Abdomen noirâtre. Longueur totale, 1^{mm},4; céphalothorax, 0^{mm},7. ♀ inconnue.

Habitat : H^{te}-Savoie : Bords de l'Arve, près de Gaillard. Un ♂ le 28 mars dans des détritns.

Cette espèce se rapproche par la forme de l'apophyse tibiale supérieure de sa patte-mâchoire de *G. latebricola* (Cambridge). Par la disposition du bulbe elle est également voisine de *G. calcariferum* Simon ¹.

¹ *Les Arachnides de France*, vol. 5, p. 606, 607, fig. 424. 1884.